

ミニリンメルトOD錠 25 μ g/50 μ gを服用される方へ

この薬は「男性における夜間多尿による夜間頻尿」の治療に用います。

- 服用の際は、『ミニリンメルト®OD錠25 μ g、50 μ gを服用される患者さんにご家族の方へ』を必ず読んでください。
- 成人男性では、通常、1日1回就寝前に1錠を服用します。
- 舌の裏に置くとすぐに溶けるので、水なしで服用してください。



ミニリンメルトOD錠 25 μ g



錠剤：(実物大) 直径12mm 厚さ3mm

ミニリンメルトOD錠 50 μ g



錠剤：(実物大) 直径12mm 厚さ3mm




夜間頻尿.com

<https://yakan-hinnyo.com/>


夜間頻尿についての情報は、「夜間頻尿.com」のサイトをご覧ください。

取り出し方


- ① 文字が読める方を手前に向けてシートを持ちます。



- ② 上部の耳をミシン目に沿って前後に折り返し、耳の部分を右側から切り離します。




- ③ シート中央のミシン目から下向き(①)、外側(②)に向かって1錠分を切り離します。



- シート両端にはミシン目が入っていないため、内側から外側に向けて切り離してください。


- ④ 「あける」の角から、シールをはがします。



- あげにくい場合:
シート端の「あける」部分をしっかり折り曲げてください。対角線上(斜め方向)に引っ張りながらはがすと、はがしやすくなります。



- ⑤ 指の腹で押し出し、薬を取り出します。



- 取り出す際に薬が欠けたり割れたりする場合がありますが、全て一緒に飲んでください。

- ⑥ 舌の裏に薬を置くと、速やかに溶けるので、水なしで飲んでください。

