

患者さんご家族の方へ

低ナトリウム血症(水中毒)

初期症状：**倦怠感、頭痛、吐き気、嘔吐**など

うっ血性心不全

初期症状：**脚の浮腫、急激な体重増加、労作時息切れ**など

これらの症状が認められた場合には、本剤の服用を中断し、
すぐに医師・薬剤師に連絡又は病院を受診してください。

本カードは常に携行し、病院を受診した際に医師・薬剤師に提示してください。

U/510TU/08/19/J
MM010B

2019年8月

ミニリンメルト®OD錠 25 μ g、50 μ gカード **RMP**

効能又は効果：男性における夜間多尿による夜間頻尿

ミニリンメルト®OD錠 25 μ g、50 μ g(デスモプレシン)を服用しています。

本剤を処方した医療機関 連絡先

医療機関名：

担当医師名：

電話番号：

<https://find.ferring.co.jp/product.php>

ミニリンメルト®OD錠25 μ g、50 μ gの安全性
情報はWebでご覧いただけます。



くすり相談室
TEL:03-3596-1109
FAX:03-3596-1107

ミニリンメルトOD錠の服用を開始した日:

年 月 日

次回受診予定日

メモ

月/日()

時間

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

ミニリンメルトOD錠の服用を開始した日:

年 月 日

次回受診予定日

メモ

月/日()

時間

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

:

/ ()

: